



Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky



Řídit se při práci s dezinfekčními přípravky návodem k použití uvedeným na etiketě výrobku.



Nikdy nemíchat různé dezinfekční přípravky mezi sebou.



Používat ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv.



Po skončení dezinfekce opláchnout řádně všechny předměty zdravotně nezávadnou vodou (dále jen „pitná voda“).

1 První pomoc pro žíraviny - způsobující poleptání kůže (C)



Při nadýchání žíravín a preparátů s obsahem chloru

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost **dopřít postiženého na čerstvý vzduch, zabránit chůzi postiženého!** Podle situace lze doporučit u postiženého výplach ústní dutiny, případně nosu pitnou vodou, převléknutí do čistého oděvu v případě, že je oděv zasažen žíravinou, zajistit postiženého proti prochladnutí; podle situace volat zdravotnickou záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Ihned vypláchnout oči proudem tekoucí pitné vody (oční víčka rozevřít i násilně); pokud má postižený aplikované kontaktní čočky, zajistit jejich okamžité vyjmutí. V žádném případě neprovádět neutralizaci! Výplach oka provádět alespoň 15 minut od vnitřního koutku k zevnímu; podle situace zajistit lékařské ošetření.

Při styku s kůží, políží

Ihned svléct potřísněné šatstvo, zasažená místa oplachovat proudem, pokud možno vlažné pitné vody po dobu 10-15 minut; poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem, na kůži nepoužívat masti ani jiná léčiva, zajistit postiženého proti prochladnutí; podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření.

Při požití

NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu. **Nepodávat nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče.** Pokud je postižený při vědomí, vypláchnout dutinu ústní vodou a podat k vypití 2-3 dl chladné pitné vody. K pití postiženého nenutit, zejména má-li bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechat postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou, nepodávat žádné jídlo a zajistit co nejrychleji lékařské ošetření.

2 Přípravky dráždivé se symbolem



Při nadýchání

Okamžitě **přerušit expozici dráždivému přípravku, dopravit postiženého na čerstvý vzduch**, zajistit postiženého proti prochladnutí; zajistit lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

Při styku s kůží, políží

Odložit potřísněný oděv, omýt postižené místo velkým množstvím, pokud možno vlažné pitné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon; zajistit lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Při zasažení očí

Ihned vypláchnout oči proudem tekoucí pitné vody (víčka otevřít i násilím); pokud má postižený aplikované kontaktní čočky, zajistit jejich okamžité vyjmutí. Výplach oka provádět nejméně 10 minut; zajistit lékařské vyšetření.

Při požití

NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ, pokud možno podat aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrčené tablety v 1-2 dl pitné vody), kontaktovat Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření (sdělit údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku, u osoby, která má zdravotní obtíže), zajistit lékařské ošetření. Nepodávat nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí nebo má křeče.

Další informace, jak poskytnout první pomoc a jak postupovat při akutní otravě získáte na informační lince Toxikologického informačního střediska:

224 919 293, 224 915 402

[Co dělat při akutní otravě \(tis-cz.cz\)](https://tis-cz.cz)

Další informace k ochraně zdraví při povodních naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví (mzd.gov.cz), Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz) a na sociální síti X [@Hygiene_cz](https://twitter.com/Hygiene_cz).